

鹿児島県漁海況週報

令和2年7月2日発行(6月25日～7月1日)
第2859報(旧暦:5月5日～5月11日/月齢:3.8～9.8/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月30日現在、竹島の南9.17マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月30日現在、71マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.1℃昇温した。

平年比較では、飯海峡で“著しく高め”、竹島、中之島で“やや高め”、笠利崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.4	+0.3	+0.3	平年並
鹿児島	25.4	+1.1	+0.5	平年並
佐多岬	24.4	+0.1	-0.3	平年並
竹島	26.0	+0.7	+0.7	やや高め
屋久島御崎	26.3	+0.0	+0.2	平年並
中之島	28.1	+0.6	+0.8	やや高め
笠利崎	26.1	+0.0	-1.1	やや低め
与路島	26.2	+0.6	-0.1	平年並
与論	27.5	+0.8	+0.4	平年並
飯海峡	26.5	+0.9	+2.2	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/30～7/1
串木野一鹿児島定期客船観測は7/1

【漁況】

○定置網

飯島海域では、週計でシマアジ(600～800g)が740kg、マルソウダ(500～600g)が730kg、スマ(500～600g)が130kg、タカサゴ(150g)が20kg/日、ニサダイ(0.8～1kg)が20kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(200g)が50～150kg/日、小トビが20～100kg/日、スマ(1.5～3kg)が60～70kg/日、カンパチ(1.5～2kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみカンパチ(1.9kg)が300kg、マダイ(400～700g)が250kg、スマ(1.5～2kg)が140kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサハ(600g)が2.4トン、ヒラソウダ(600g)が240kg、カンパチ(1kg)が130kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がサハ類小、サハ類中、マアジ小主体に34トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ、ニハ類主体に8.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

飯島海域では、3～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロブ曳網

種子島海域では、小トビを130箱/統・日、中トビを13箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを5～7箱/統・日、青トビを6～7箱/統・日、セトビを33～36箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、かごでシロサハフグ(200～300g)を200～250kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.8～1kg)を30～50kg/隻・日、チダイ(200～400g)を8～20kg/隻・日、1日のみアサギ(1kg)を7kg/隻の漁。一本釣りでイサキ(300～600g)を6～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～300kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(400～500g)を20～50kg/隻・日、メバル(500g)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(0.6～1kg)を週計で50kg/隻の漁。潜水器漁業でトサカリを週計で8.5トンの漁。志布志湾海域では、刺網でヒラキ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。底曳網でキダイ(300～400g)を60～70kg/隻・日、ヒラキ(100～200g)を30～40kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでタマシラ(300～400g)を40～50kg/隻・日、カンパチ(4～22kg)を30～40kg/隻・日、ゴマサハ(500～600g)を80尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～3日操業でソデイカ(胴体のみ9～10kg)を6ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2812報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	5	飯西	ウメイワシ93	4.9	5	83	2	6
		中	9	36	長島 阿久根沖 飯西	カクチイワシ40 ウメイワシ15 サッパ12	3.9	21	189	9	51
	枕崎	大	5	236	馬毛島 野間池沖	ゴマサハ中87 マイワシ6	47.2	3	86	1	3
		中	3	60	馬毛島 竹島	ゴマサハ中98	20.1	5	78	3	14
	内之浦	中	0	—			—	0	—	2	11
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	6	241			40.2	8	169	3	9	
	中	12	96			8.0	26	267	14	76	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	30	30	阿久根沖 長島	ウメイワシ49 カクチイワシ24 サハ類16	1.0	70	85	45	80	
	内之浦	0	—			—	1	3	0	—	
定置網	内之浦	41	34		サハ類小55 サハ類中14 マアジ小7	0.8	39	28	40	20	
刺網	阿久根	大	0	—	飯 長島		—	0	—	0	—
		小	0	—	川内沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	87	19	57	9
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	0	—	0	—	
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	1	2
		海旋	1	758		カツオ小69 キダダ20 メパチ6	758.4	1	782	1	1140



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月1日発行「海洋通報令和2年120号」による。