



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、9月15日現在、平瀬の北4.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月15日現在、80マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で0.6℃降温し、甑海峡で変わらず、その他の海域で0.1～1.7℃昇温した。

平年比較では、与路島で“やや高め”、佐多岬、竹島で“やや低め”、屋久島御崎で“かなり低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 28.7 | +0.4 | -0.0 | 平年並 |
| 鹿児島 | 26.8 | +0.5 | -0.3 | 平年並 |
| 佐多岬 | 26.8 | +0.2 | -0.6 | やや低め |
| 竹島 | 27.1 | +0.8 | -0.7 | やや低め |
| 屋久島御崎 | 27.3 | -0.6 | -0.8 | かなり低め |
| 中之島 | 28.6 | +1.7 | +0.3 | 平年並 |
| 笠利崎 | 28.3 | +0.1 | +0.1 | 平年並 |
| 与路島 | 28.6 | +0.4 | +0.4 | やや高め |
| 与論 | 28.5 | - | +0.2 | 平年並 |
| 甑海峡 | 26.9 | +0.0 | -0.0 | 平年並 |

鹿児島ー那覇定期客船観測は9/15-16
串木野ー甑定期客船観測は9/16

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、フリ(700～800g)が200kg/日、コマサハ(180～200g)が100～200kg/日、ヤマトカマス(80g)が150kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、週計でキンガメアシ(1kg)が1トン、カンパチ(0.3～4kg)が550kg、ハガツオ(1～2kg)が310kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサハ(200～300g)が600kg、スマ(2kg)が540kg、ツムフリ(1.7kg)が480kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がハマフエキ、カマス類、ヘタイ主体に26トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタイ類、タチウオ、ニベ類主体に10.6トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを50～150箱/統・日、小トビを5～10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを29～88箱/統・日、セトビを4～17箱/統・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、2～6kgを3～250尾/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2818報)


| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | |
|-------|-----|----|---------|--------------|---------------|---------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 7 | 252 | 甑西 甑下 天草沖 | 36.0 | 1 | 9 | 3 | 145 |
| | | 中 | 34 | 480 | 甑西 甑下 | 14.1 | 3 | 32 | 12 | 125 |
| | 枕崎 | 大 | 8 | 365 | 黒島 津倉 馬毛島 | 45.6 | 0 | - | 7 | 356 |
| | | 中 | 18 | 414 | 硫黄島沖 馬毛島 屋久島南 | 23.0 | 1 | 32 | 21 | 524 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - |
| | 山川 | 中 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - |
| 計 | 大 | 15 | 617 | | 41.1 | 1 | 9 | 10 | 501 | |
| | 中 | 52 | 894 | | 17.2 | 4 | 64 | 33 | 649 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - | |
| | 枕崎 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - | |
| 棒受網 | 阿久根 | 71 | 114 | 阿久根沖 長島 | 1.6 | 13 | 22 | 58 | 87 | |
| | 内之浦 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - | |
| 定置網 | 内之浦 | 34 | 26 | | 0.8 | 17 | 35 | 29 | 12 | |
| 刺網 | 阿久根 | 32 | 3 | 甑 牛深沖 川内沖 長島 | 0.1 | 5 | 0.3 | 56 | 6 | |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 大 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - |
| | | 小 | 0 | - | | - | 0 | - | 0 | - |
| | 海旋 | 大 | 1 | 1086 | | 1,086.0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 小 | 1 | 1086 | | 1,086.0 | 0 | - | 0 | - |
| 海外旋網 | 山川 | 中 | 3 | 24 | | 8.0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 海旋 | 2 | 1808 | | 904.0 | 0 | - | 0 | - |

○パショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～30kgが週計で5尾、鹿児島湾口部薩摩半島側で22～35kgが週計で4尾の入網。流し網では、甑島海域で20～30kgが週計で7尾の漁。

○その他

西薩海域では、底曳網でツヒガイ(100g)を50kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.5～3kg)を9～30kg/隻・日、オオモンハタ(1kg)を7kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を7kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～300kg/隻・日の漁。かかり網でアサヒガニ(300～500g)を20～40ハイ/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2～3kg)を60～100kg/隻・日の漁。すくい網でトビウオ(200～300g)を10箱/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1.5～4.5kg)を40kg/隻・日、オオニベ(2～3kg)を30kg/隻・日、コウイカ(200～500g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～12kg)を20尾/隻・日、タマガシラ(300～400g)を50kg/隻・日、ハマダイ(1～4kg)を40～50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの4～5日操業でキハダ(30kg)を20尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月16日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月16日発行「海洋速報令和2年172号」による。