




【海況】
○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
 黒潮北縁域は、12月9日現在、竹島の南7.3マイル付近にあり、接岸している。
○黒潮流軸(種子島東)
 種子島東の黒潮流軸は、12月8日現在、62マイル付近にある。
○定期船等による表面水温
 各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬、竹島、甌海峡で0.1～1.9℃升温し、その他の海域で0.3～1.1℃降温した。
 平年比較では、佐多岬、甌海峡で“著しく高め”、中之島、笠利崎で“やや高め”、鹿児島、与論で“平年並”、その他の海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃


定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.8	-0.4	+0.8	かなり高め
鹿児島	20.3	-0.4	+0.4	平年並
佐多岬	22.8	+1.9	+1.6	著しく高め
竹島	23.8	+0.1	+1.3	かなり高め
屋久島御崎	24.3	-0.3	+1.3	かなり高め
中之島	24.5	-0.6	+0.8	やや高め
笠利崎	23.7	-0.6	+0.5	やや高め
与路島	24.2	-0.7	+0.7	かなり高め
与論	23.9	-1.1	+0.2	平年並
甌海峡	22.6	+1.1	+2.7	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は12/7-9
串木野一甌定期客船観測は12/9

【漁況】
○定置網
 甌島海域では、週計でカンパチ(0.8～1.3kg)が1.2トン、ハガツオ(1.5kg)が890kg、イサキ(200～400g)が790kg、ゴマサハ(100g)が170kgの入網。西薩南部海域では、カンパチ(0.6～2kg)が20～30kg/日、週計でゴマサハ(50～180g)が9トン、サワ(0.6～1kg)が100kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラソウダ(1～2kg)が250～750kg/日、ハガツオ(1.5～1.6kg)が150～280kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でタチウオ(400～500g)が700kg、ゴマサハ(300g)が330kg、スマ(600～700g)が310kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で42統がカマス類、マシ豆、ソウダガツオ類主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、マシ豆、ヒラソウダ主体に9.3トンの入網。
○パッチ網
 西薩海域では、生で1トン/統・日の漁があり、製品で27トンの入札があった。
○トビウオロープ曳網
 種子島海域では、中トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では、1日の中トビを32箱/統の漁。
○ブリ銅付け
 鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～6kgを1尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3kgを108尾/隻・日の漁。
○キビナゴ刺網
 甌島海域では、1日のみ3箱/隻の漁。
○その他
 西薩海域では、底曳網でツキガイ(100g)を60kg/隻・日の漁。延縄でアカマダイ(300g)を8～38kg/隻・日、キダイ(300g)を11～12kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を6～30kg/隻・日の漁。一本釣りではカンパチ(1kg)を7～17kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(1.5kg)を48kg/隻・日、サワ(0.7～6kg)を21kg/隻・日、カツオ(1.5kg)を14kg/隻・日、ハガツオ(1.5kg)を1日のみ20kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でカンソウヒラメ(300～700g)を30kg/隻・日、マダイ(1kg)を10kg/隻・日、カイワリ(200～400g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りではゴマサハ(600～700g)を80尾/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ釣りの漁況は下記の表に記載しています)
業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2829報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日		前年同期			
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	0	—	1	39		
		中	9	100	甌東	サハ類小43 サハ類豆18 マシ豆12	11.1	5	39	3	38
	枕崎	大	4	124	志布志沖	ゴマサハ大23 ゴマサハ豆17 マシ豆中小16	31.0	0	—	2	62
		中	12	154	種子島南 島間沖 竹島 屋久島南	クサヤモロ小71 クサヤモロ中小10 ゴマサハ豆7	12.8	4	92	9	170
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	計	大	4	124	—	—	31.0	0	—	3	101
中	21	254	—	—	—	12.1	9	131	12	208	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	0	—	0	—		
	枕崎	0	—	—	—	0	—	0	—		
棒受網	阿久根	4	7	長島	カクチイワシ44 ウルメイワシ40 マイワシ小9	1.7	1	0.4	0	—	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	42	14	—	カマス類21 マシ豆15 ソウダガツオ類14	0.3	42	26	46	18	
刺網	阿久根	大	33	3	甌 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.1	22	2	24	2
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
カツオ釣り	枕崎	大	2	521	—	カツオ大73	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	1	737	—	キハダ36 カツオ中32 カツオ小19	737.2	2	1736	0	—	
海外旋網	山川	中	2	23	—	キハダ52 カツオ小48	11.7	0	—	4	30
		海旋	1	751	—	カツオ小70 キハダ25	750.6	1	1014	1	710



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月9日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月9日発行「海洋通報令和2年228号」による。