



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月12日現在、竹島の南2.8マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月13日現在、50マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬、竹島、屋久島御崎で2.9～4.8℃昇温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1～1.3℃降温した。

平年比較では、佐多岬、竹島、屋久島御崎、与路島で“著しく高め”、黒潮流域、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.4	-0.1	+0.9	やや高め
鹿児島	17.6	-0.3	-0.1	平年並
佐多岬	21.7	+3.2	+2.7	著しく高め
竹島	22.7	+2.9	+2.1	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	24.1	+4.8	+2.8	著しく高め
中之島	23.0	-1.3	+0.1	平年並
笠利崎	22.1	-0.7	+0.2	平年並
与路島	22.6	-0.4	+1.2	著しく高め
与論	22.2	+0.0	+0.4	やや高め
甕海峡	18.1	-0.7	-0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は4/8-13  
串木野一甕定期客船観測は4/14

## 【漁況】

### ○定置網

鹿児島海域では、週計でブリ(10kg)が422kg、メジナ(500～600g)が365kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(6kg)が600kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、チウオ(700～800g)が0.3～1トン/日、1日のみブリ(6kg)が4トン、マサシ(10g)が910kg、ヒラマサ(6～8kg)が280kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサハ(200～400g)が2トン、マサシ(100～400g)が400kg、メジナ(0.8～1kg)が250kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がカクチイワシ、カマス類、マサシ小主体に17トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、チウオ、コマサハ主体に9.6トンの入網。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを21～63箱/統・日、中トビを5～23箱/統・日、中中トビを4箱/統・日、中中小トビを1～2箱/統・日の漁。

### ○パッチ網

西薩海域では、生で1トン/統・日の漁。志布志湾海域では製品で16.9トンの入札があった。

### ○キビナゴ刺網

鹿児島海域では、6～9箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～8箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、1日のみ15箱/隻の漁。

### ○その他


西薩海域では、一本釣りでイサキ(300～800g)を10～50kg/隻・日、1日のみメジナ(600～800g)を30kg/隻の漁。ごち網でマダイ(0.5～5kg)を8～50kg/隻・日、チダイ(150～400g)を5～13kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイ(100g)を25～32kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1kg)を11～12kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～150kg/隻・日の漁。刺網でキス(40～70g)を8～13kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみコマサハ(1～2kg)を30kg/隻、イトヨリダイ(200～400g)を20kg/隻、マダイ(0.6～1.5kg)を10kg/隻、ハモ(0.6～1.2kg)を10kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサハ(500～700g)を40～80尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～4日操業でソデイカ(胴体のみ10～11kg)を12～13ハイ/隻の漁。延縄の2日操業でキンメダイ(1kg)を65kg/隻、ナンヨウキンメ(1kg)を80kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2846報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	15	343	縄瀬 長崎沖	サバ類小50 マサシ豆32 マサシ小7	22.9	2	30	6	86
		中	10	93	甕西 縄瀬 野間池沖	サバ類小53 マサシ豆17 ウルメイワシ11	9.3	6	114	16	278
	枕崎	大	5	239	湯瀬 甕東	コマサハ小35 コマサハ中小32 マサシ豆15	47.8	1	42	8	1118
		中	14	183	立目崎沖 枕崎沖 甕東	マサシ豆49 ウルメイワシ23 マサハ豆22	13.1	15	287	19	1089
	内之浦	中	0	—			—	2	8	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	20	582			29.1	3	72	14	1204
中	24	276				11.5	23	409	35	1367	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	6	3	阿久根沖 長島	カクチイワシ100	0.5	2	0.4	13	6	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	37	17		カクチイワシ23 カマス類13 マサシ小12	0.5	39	22	51	33	
刺網	阿久根	38	4	牛深沖 長島 阿久根沖 甕	キビナゴ100	0.1	34	3	44	4	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	736		カツオ中66 カツオ小25 キハダ8	736.3	0	—	0	—	
		1	784		カツオ小95	13.6	15	194	0	—	
海外旋網	山川	中	9	123							
		海旋	1	784		カツオ小76 キハダ21	784.2	1	746	1	260



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月14日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁4月14日発行「海洋遠程令和3年70号」による。