

鹿児島県漁海況週報

令和4年8月4日発行(7月28日～8月3日)
第2964報【旧暦:6月30日～7月6日/月齢29.0～5.4/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月3日現在、平瀬の北6.9マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月2日現在、55マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬で変わらず、鹿児島、竹島、甌海峡で0.1～0.8℃昇温し、その他の海域で0.4～1.1℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“やや高め”、鹿児島、佐多岬、竹島で“平年並”、笠利崎で“やや低め”、屋久島御崎、与路島で“かなり低め”、その他の海域で“著しく低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.0	-0.4	-1.5	著しく低め
鹿児島	27.2	+0.3	-0.5	平年並
佐多岬	27.3	+0.0	-0.4	平年並
竹島	27.7	+0.1	-0.5	平年並
屋久島御崎(永田岬)	27.7	-0.6	-0.9	かなり低め
中之島	27.6	-0.7	-1.2	著しく低め
笠利崎	27.7	-0.6	-0.8	やや低め
与路島	27.1	-1.1	-1.4	かなり低め
与論	27.0	-1.0	-1.8	著しく低め
甌海峡	29.3	+0.8	+1.3	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、8/1～8/3(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は8/3

【漁況】

時化のため、一般的に低調な漁模様

○定置網

西薩南部海域では、シラ(2～4kg)が50～100kg/日、カンパチ(400g)が100kg/日、ハガツオ(0.9～1kg)が50～60kg/日、1日のみハシヨウカシキ(25kg)が2尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(500g)が80～100kg/日、1日のみキハダ(30kg)が1尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がウルメイワシ、カマス類、フリ主体に33tの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、テンジクダチ、ニヘ類主体に9.0tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみセトビを5箱/統の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～13箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、3～20箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、製品で2tの入札があった。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.2～3kg)を10～30kg/隻・日の漁。延縄でアカアマダイ(300g)を4～14kg/隻・日、キダイ(300g)を7～12kg/隻・日の漁。一本釣りで1日のみイサキ(200～600g)を37kg/隻、スジアラ(3kg)を26kg/隻の漁。刺網で1日のみアサヒシラメ(300g)を11kg/隻の漁。志布志湾海域では、一本釣りでチウオ(1kg)を5kg/隻・日、マアジ(300g)を3kg/隻・日の漁。かごでマダコ(1～2kg)を5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(5～37kg)を80kg/隻・日、アオダイ(1kg)を20～30kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの日帰り操業でハマダイ(1～7.3kg)を10kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2915報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	9	野間池沖 串本野沖	マアジ小46 サハ類小38	4.5	2	10	1	21
		中	12	91	長島 串本野沖 野間池沖 牛深沖	ウルメイワシ35 カクチイワシ32 マアジ小8	7.6	18	116	7	22
	枕崎	大	3	57	馬毛島 野間池沖	ゴマサハ中60 ウルメイワシ40	19.0	11	171	9	122
		中	6	47	野間池沖 馬毛島宇治	ゴマサハ中47 ウルメイワシ17 ゴマサハ豆9	7.8	12	154	10	119
	内之浦	中	0	—			—	1	7	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	5	66			13.2	13	181	10	143
中	18	138				7.7	31	277	17	141	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	56	158	阿久根沖 長島	ウルメイワシ87 カクチイワシ10	2.8	68	171	65	72	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	33		ウルメイワシ22 カマス類16 フリ15	0.9	34	51	34	21	
刺網	阿久根	34	5	甌 川内沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	51	7.1	30	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—			—	0	—	0	
		海旋	0	—			—	2	2108	0	—
海旋	0	—			—	0	—	0	—		
海旋	0	—				—	1	1005	1	737	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月3日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月3日発行「海洋速報令和4年143号」による。