

# 鹿児島県漁海況週報


令和4年9月1日発行(8月25日～8月31日)  
第2968報【旧暦：7月28日～8月5日/月齢27.4～3.8/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

- 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は、8月28日現在、屋久島御崎の南0.9マイル付近にある。
- 黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は、8月30日現在、53マイル付近にある。
- 定期船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎、与論、甑海峡で0.1～0.5℃昇温し、与路島で変わらず、その他の海域で0.1～0.2℃降温した。  
平年比較では、黒潮流域、中之島で“やや高め”，笠利崎、与路島で“かなり高め”，その他の海域で“著しく高め”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.0	-0.1	+0.8	やや高め
鹿児島	30.2	-0.1	+2.1	著しく高め
佐多岬	30.1	-0.1	+1.9	著しく高め
竹島	29.7	-0.2	+1.3	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	30.0	-0.2	+1.3	著しく高め
中之島	29.4	-0.1	+0.6	やや高め
笠利崎	30.0	+0.1	+1.6	かなり高め
与路島	29.7	+0.0	+1.3	かなり高め
与論	30.4	+0.5	+1.8	著しく高め
甑海峡	30.9	+0.5	+2.8	著しく高め

鹿児島～那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、8/28～8/30  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野～甑定期客船(フェリーニューこしき)観測は8/31

## 【漁況】


- 定置網**  
西薩南部海域では、カンパチ(0.4～1kg)が100～500kg/日、シイラ(3～4kg)が300kg/日、ツムブリ(2～4kg)が20～200kg/日、ハガツオ(1kg)が50kg/日、ハシロウカジキ(20～30kg)が1～3尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がウルメイワシ、カマス類、マジン小主体に23tの入網。志布志湾南部海域では、週計で好ウオ、テンシクダチ、マジン主体に6.2tの入網。
- キビナゴ刺網**  
甑島海域では、4～17箱/隻・日の漁。
- トビウオロープ曳網**  
屋久島海域では、中トビを9～10箱/統・日、セミトビを3～10箱/統・日の漁。
- その他**  
甑島海域では、一本釣りでカンパチ(7～30kg)を100～150kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(500～600g)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でアカアマダイ(300g)を13～23kg/隻・日の漁。一本釣りでスジアラ(2～3kg)を25～35kg/隻・日、カンパチ(0.7～1kg)を10～14kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(200～500g)を5～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを150～250kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2kg)を30kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でオコエ(1kg)を40kg/隻・日、マダイ(1～2kg)を30kg/隻・日、チウオ(500～600g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を15～16kg/隻・日、カンパチ(3～20kg)を10～20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3～5日操業で、キハダ(17～45kg)を250～740kg/隻、メハチ(29kg)を260kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2919報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期	
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	2	75	サバ類豆92	37.3	0	—	4	170
		中	8	106	津倉 串木野沖 津倉 東長島 甑下 津倉	13.2	10	54	11	79
	枕崎	大	9	207	ゴマサバ豆73 マサバ大12 ウルメイワシ8	23.0	8	246	8	214
		中	22	528	甑下 津倉 鷹島 湯瀬	24.0	14	310	14	192
	内之浦	中	0	—		—	0	—	0	—
	山川	中	0	—		—	0	—	0	—
計	大	11	282		25.6	8	246	12	384	
	中	30	634		21.1	24	364	25	271	
東海旋網	阿久根	0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—		—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	70	135	阿久根沖 長島	ウルメイワシ91 サツバ7	1.9	49	141	50	128
	内之浦	0	—		—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	38	23		ウルメイワシ20 カマス類11 マジン小11	0.6	35	9	30	16
刺網	阿久根	大	0	—		—	0	—	0	—
		小	0	—		—	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	1100		1,100.2	2	1427	1	717
		山川	中	1	3		3.1	0	—	2
	海旋	0	—		—	1	804	1	129	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月31日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月31日発行「海洋通報令和4年162号」による。