

鹿児島県漁海況週報

令和5年6月15日発行(6月8日～6月14日)
第3007報【旧暦：4月20日～4月26日/月齢19.5～25.5/潮汐：中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月13日現在、屋久島御崎の北10.5マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月13日現在、667ル付付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、竹島、中之島、甌海峡で0.1～0.8℃降温し、鹿児島、屋久島御崎で変わらず、その他の海域で0.5～2.0℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、中之島で“やや低め”，鹿児島、笠利崎、与路島で“平年並”，屋久島御崎で“かなり高め”，その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.3	-0.2	-0.5	やや低め
鹿児島	23.3	+0.0	+0.4	平年並
佐多岬	24.3	+2.0	+1.1	やや高め
竹島	25.2	-0.8	+1.0	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	26.3	+0.0	+1.2	かなり高め
中之島	25.9	-0.2	-0.3	やや低め
笠利崎	24.9	+0.8	-0.2	平年並
与路島	24.6	+1.0	-0.1	平年並
与論	25.8	+0.5	+0.6	やや高め
甌海峡	23.7	-0.1	+0.7	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、6/12～13(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、6/14

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハガツオ(0.3～2kg)が340kg、カンパチ(1.5～2kg)が170kg、ウルメイワシ(250g)が100kgの入網。イサキ(300～800g)が200kg/日、ゴマサバ(600～800g)が40～100kg/日の入網。西薩南部海域では、ハガツオ(500g)が500kg/日、スマ(1.5～2kg)が50～100kg/日、イサキ(0.5～1kg)が50kg/日、シイラ(3kg)が50kg/日、1日のみゴマサバ(500～600g)が300kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.8kg)が200～400kg/日、シイラ(3～4kg)が300kg/日、シマアジ(700g)が70～150kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1.6～4kg)が1.2t、ゴマサバ(300～400g)が720kg、シイラ(1.8～2.6kg)が270kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がウルメイワシ、サバ類小、ソウダガツオ類主体に31tの入網。志布志湾南部海域では、週計で好ウオ、ニヘ類主体に19.2tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～8箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～12箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で14箱の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域ではセトビを10～40箱/統・日、青トビを4～10箱/統・日、中トビを3～8箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を6～50kg/隻・日、チダイ(300g)を5～30kg/隻・日、キダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を10～33kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを150～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、1日のみかご網でハイを30kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでマダイ(5～6kg)を80kg/隻・日、カンパチ(3～21kg)を80kg/隻・日、ハマダイ(3～4kg)を20kg/隻・日、ゴマサバ(500～700g)を70尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～3日操業でハマダイ(1～2kg)を20kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2954報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	0	—	5	158	
		中	10	98	長島 野間池沖	カタチイワシ44 サッパ11 サバ類中10	9.8	1	21	14	107
	枕崎	大	2	21	湯瀬 メクラ曾根	ゴマサバ小52 オアカムロ大18 ゴマサバ大14	10.4	0	—	6	156
		中	11	140	津倉 野間池沖 湯瀬 硫黄島沖	ゴマサバ中小46 ウルメイワシ36 ゴマサバ豆5	12.7	0	—	24	296
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	2	21			10.4	0	0	11	314	
	中	21	238			11.3	1	21	38	403	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	36	61	阿久根沖 長島	カタチイワシ39 マイワシ仔30 ウルメイワシ22	1.7	6	3	31	31	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	41	31		ウルメイワシ29 サバ類小18 ソウダガツオ類9	0.7	37	73	35	35	
刺網	阿久根	65	9	甌 長島 川内沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	35	6	86	23	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	1	668	1	734	
	山川	中	8	89		カツオ小91 キハダ7	11.1	14	135	6	53
	海旋	0	—			—	1	927	1	1127	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月14日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月14日発行「海洋速報令和109号」による。