

鹿児島県漁海況週報

令和元年8月22日発行(8月15日～8月21日)
第2816報【旧暦：7月15日～7月21日/月齢14.0～20.0/潮汐：大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月19日現在、竹島の南6.0マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月19日現在、68マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週欠測となった与路島、与論を除き、先週と比較して、笠利崎で0.5℃昇温し、その他の海域で0.4～1.6℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、鹿児島、佐多岬、中之島、甌海峡で“やや低め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.7	-0.7	-0.6	やや低め
鹿児島	27.5	-1.1	-0.7	やや低め
佐多岬	27.6	-0.9	-0.5	やや低め
竹島	28.3	-0.6	-0.1	平年並
屋久島御崎	28.5	-0.4	-0.1	平年並
中之島	28.1	-0.9	-0.6	やや低め
笠利崎	28.7	+0.5	+0.2	平年並
与路島	28.0	-	-0.4	平年並
与論	28.8	-	+0.1	平年並
甌海峡	27.6	-1.6	-0.7	やや低め

鹿児島～那覇定期客船観測は8/19～20
串木野～甌定期客船観測は8/20

【漁況】

台風の影響で全般に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、キングマシ(6kg)が200～600kg/日、ヒソウダ(300～400g)が200kg/日、カンパチ(0.2～2kg)が50～100kg/日、シイラ(1～3kg)が50～60kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でシイラ(2.5～5kg)が380kg、カンパチ(0.5～4kg)が170kg、ヒソウダ(1kg)が120kg、ゴマサバ(200～300g)が60kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で16統がマシ豆、カマス類、ソウダガツオ類主体に11トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、カンパチ、ニベ類主体に1.9トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～12箱/隻・日の漁。熊毛海域では、7箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、1日のみ中ヒを22箱/統、セトヒを11箱/統の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りで1日のみカンパチ(5～6kg)を70～80kg/隻、スマ(2kg)を80kg/隻の漁。西薩海域では、かごでサハフグ(100～300g)を80～300kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイを40～50kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(300～600g)を10～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を10kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1～2kg)を5～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～200kg/隻・日の漁。一本釣りでシイラ(2kg)を50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.6～1.7kg)を30kg/隻・日、マダイ(1～2.2kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでアオダイ(700～800g)を30～40kg/隻・日、ハマダイ(2～3kg)を20～30kg/隻・日、カンパチ(4～5kg)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の2～3日操業でチカキントキ(1kg)を160kg/隻、ムツ(1～1.5kg)を100kg/隻、マダイ(5～8kg)を50kg/隻、キンメダイ(1kg)を30kg/隻、ナンヨウキンメ(1kg)を30kg/隻の漁。延縄の日帰り操業でチウオ(1～1.2kg)を30kg/隻の漁。一本釣りの日帰り操業でハマダイ(1～2.5kg)を80kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2769報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	60	ウルメイワシ41 サハ類仔35 マシ小20	20.0	5	79	0	-	
		中	0	-	-	-	14	93	2	19	
	枕崎	大	1	50	坊津沖	ウルメイワシ67 マサバ豆23 ゴマサバ豆10	50.0	3	78	2	27
		中	6	87	坊津沖 野間池沖	ウルメイワシ76 マサバ豆14 ゴマサバ豆9	14.5	1	9	3	14
	内之浦	中	0	-	-	-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	0	-	0	-	
計	大	4	110	-	-	27.5	8	157	2	27	
	中	6	87	-	-	14.5	15	102	5	32	
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	0	0	0	0	-	
	枕崎	0	-	-	-	0	0	0	0	-	
棒受網	阿久根	23	72	阿久根沖 長島	ウルメイワシ92 サハ類仔5	3.1	48	51	2	2	
	内之浦	0	-	-	-	0	0	0	0	-	
定置網	内之浦	16	11	-	マシ豆41 カマス類14 ソウダガツオ類11	19	19	90	31	58	
刺網	阿久根	21	2	阿久根沖 甌牛深沖	キビナゴ100	0.1	56	7	1	0.3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	0	0	0	-	
		小	0	-	-	-	0	0	0	-	
	海旋	1	695	カツオ中62 キハダ25 カツオ大11	695.0	0	-	1	470		
		2	940	キハダ37 カツオ小31 シイラ25	4.0	0	-	0	-		
山川	中	1	4	-	-	4.0	0	-	0	-	
	海旋	2	940	-	-	470.0	1	807	2	1386	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月21日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月21日発行「海洋速報令和元年153号」による。