

鹿児島県漁海況週報

令和元年10月10日発行(10月3日～10月9日)
第2823報【旧暦：9月5日～9月11日/月齢：4.4～10.4/潮汐：中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月9日現在、竹島の北6.2マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月8日現在、25マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島で0.4℃昇温し、その他の海域で0.1～1.6℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“著しく高め”、鹿児島、佐多岬、笠利崎、与路島で“やや高め”、屋久島御崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.4	-0.4	+0.1	平年並
鹿児島	25.8	-1.1	+0.8	やや高め
佐多岬	26.2	-0.4	+0.5	やや高め
竹島	26.5	-0.7	+0.1	平年並
屋久島御崎	26.1	-1.6	-0.6	やや低め
中之島	26.9	-0.4	-0.1	平年並
笠利崎	27.4	-0.1	+0.7	やや高め
与路島	28.1	+0.4	+0.9	やや高め
与論	27.8	-	+0.4	平年並
甌海峡	27.0	-0.8	+1.9	著しく高め

鹿児島～那覇定期客船観測は10/8-10
串木野～甌定期客船観測は10/9

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ヤマトカマス(100g)が200～600kg/日、シイラ(1～2kg)が100kg/日、ヒラサ(2kg)が20～40kg/日、キハダ(8kg)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、キンガマシ(2.2～2.5kg)が200～250kg/日、ヒラサ(1.5～1.7kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でヤマトカマス(100～200g)が590kg、フリ(0.8～1kg)が510kg、イサキ(400～500g)が400kg、ヒラソウダ(1～1.2kg)が180kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がムロアシ、カマス類、ヘダイ主体に13トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタイ類、サワラ、ヤマトカマス主体に6.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～10箱/隻・日の漁。種子島海域では、12～13箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、生で1日のみ500kg/統の漁。志布志湾海域では製品で4.6トンの入札があった。

○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～40kgが3～8尾/日、鹿児島湾口部大隅半島側で18～28kgが週計で8尾の入網。流し網では、甌島海域で16～34kgを2～10尾/隻・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～4kgを10～300尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgを週計で300尾の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを27～87箱/統・日、セトビを1～2箱/統・日、小トビを1～3箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(100g)を40～50kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.7～1kg)を5～27kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を4～19kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でチダイ(200～300g)を20kg/隻・日、カイワリ(100～200g)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を60kg/隻・日、ゴマサバ(500～600g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの5日操業でキハダ(20～30kg)を39尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2776報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	186	津倉 野間池沖	ウルメイワシ54 サバ類豆22 サバ類仔5	26.6	5	259	4	114
		中	7	21	長島 野間池沖 縄瀬	マサシ仔23 カタチイワシ20 好ウオ15	3.0	17	197	12	107
	枕崎	大	7	685	坊津沖 野間池沖	ウルメイワシ50 マサハ豆38 ゴマサハ豆10	97.8	5	177	9	314
		中	17	437	坊津沖 野間池沖 内之浦沖	ウルメイワシ54 マサハ豆24 ゴマサハ豆7	25.7	17	610	33	978
	内之浦	中	0	—			—	0	—	2	17
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	14	871			62.2	10	436	13	428	
	中	24	458			19.1	34	807	47	1103	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	27	68	阿久根沖 長島	ウルメイワシ92	2.5	54	153	50	146	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	37	13		ムロアシ33 カマス類29 ヘダイ9	0.4	29	39	26	15	
刺網	阿久根	22	2	甌 牛深沖 川内沖	キビナゴ100	0.1	49	6	30	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	海旋	0	—			—	2	1479	0	—
		中	0	—			—	2	12	2	5
	海旋	1	667		カツオ小51 キハダ33 カツオ中11	667.4	2	1418	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月9日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁10月9日発行「海洋通報令和元年186号」による。