

鹿児島県漁海況週報

令和元年11月14日発行(11月7日～11月13日)
第2828報【旧暦：10月11日～10月17日/月齢：10.0～16.0/潮汐：若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月12日現在、平瀬の北8.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月12日現在、33マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬で0.6℃昇温し、その他の海域で0.2～0.9℃降温した。

平年比較では、甑海峡で“かなり高め”，鹿児島、佐多岬、笠利崎、与路島で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.4	-0.3	-0.1	平年並
鹿児島	23.1	-0.5	+1.0	やや高め
佐多岬	24.1	+0.6	+1.0	やや高め
竹島	24.5	-0.3	+0.2	平年並
屋久島御崎	24.6	-0.9	-0.0	平年並
中之島	25.1	-0.4	-0.1	平年並
笠利崎	25.4	-0.4	+0.7	やや高め
与路島	25.8	-0.6	+0.7	やや高め
与論	25.8	-0.2	+0.4	平年並
甑海峡	23.5	-0.6	+1.5	かなり高め

鹿児島ー那覇定期客船観測は11/10-13
串木野ー甑定期客船観測は11/13

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ゴマサハ(200～300g)が500kg/日、マシ(50g)が200～300kg/日、キンカマシ(150～200g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサハ(500～600g)が0.4～1.2トン/日、カンパチ(1kg)が250～350kg/日、クサヤモロ(100～150g)が1日のみ750kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でムロアシ(200～300g)が780kg、シラ(1～8kg)が400kg、イサキ(400～500g)が320kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がムロアシ、カマス類、マシ主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサワラ、ヤマトカマス、マシ主体に12.0トンの入網。

○バショウカジキ情報

定置網では、甑島海域で週計で25～45kgが30尾、西薩南部海域では20～30kgが1～2尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側では週計で24～33kgが4尾の漁。

○キビナゴ刺網

甑島海域では、3～8箱/隻・日の漁。種子島海域では2～10箱/隻・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3.5～5kgを70～300尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、1～1.5kgを300尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、1.3～1.4kgを210～350尾/隻・日、6～7kgを20～30尾/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを30箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを7～124箱/統・日、中中トビを8箱/統・日、中中トビを1日のみ24箱/統の漁。

○その他


西薩海域では一本釣りでマシ(500g)を50～60kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナカエビを100～250kg/隻・日の漁。一本釣りでアカイサキ(1kg)を30～60kg/隻・日の漁。熊毛海域では、かかり網でアサヒカニ(200～500g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りの日帰り操業でゴマサハ(600～700g)を30～40尾/隻、ハマダイ(3～4kg)を30～40kg/隻、メダイ(1～5kg)を60kg/隻、カンパチ(5～6kg)を60kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの7～8日操業でソデイカ(胴体のみ3～7kg)を129～516ハイ/隻の漁。旗流しの2～4日操業でソデイカ(胴体のみ3～7kg)を10～35ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2781報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	79	長崎 甑東	ウルメイワシ84 マシ仔16	39.6	2	101	9	226
		中	5	18	阿久根沖 野間池沖	サハ類豆36 ウルメイワシ22 アカアジ18	3.6	12	60	7	129
	枕崎	大	5	204	西新曾根 草垣 野間池沖	オアカムロ大54 クサヤモロ豆14 アカアジ小11	40.7	9	296	3	98
		中	6	94	竹島 野間池沖 黒島 枕崎沖	クサヤモロ豆63 マサハ豆16 マシ豆6	15.7	12	569	11	236
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	7	283			40.4	11	397	12	324	
	中	11	112			10.2	24	628	18	366	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	1	103	0	—	
棒受網	阿久根	20	69	阿久根沖 長島	ウルメイワシ96	3.4	36	65	30	20	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	48	21		ムロアシ38 カマス類11 マシ7	0.4	47	14	49	16	
刺網	阿久根	32	3	甑 川内沖 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	55	6	82	10	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	0	—			—	2	1849	0	—	
	山川	中	7	53		キハダ60 カツオ小30 シラ7	7.5	4	24	5	47
海旋		1	741		カツオ小59 キハダ28 カツオ中10	740.6	1	750	1	786	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月13日発行「海洋速報令和元年208号」による。