

鹿児島県漁海況週報

令和2年7月22日発行(7月16日～7月21日)
第2862報【旧暦:5月26日～6月1日/月齢:24.8～0.4/潮汐:若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月20日現在、屋久島御崎の北1.5マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月20日現在、67マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～1.4℃昇温した。

平年比較では、中之島で“かなり高め”，黒潮流域で“やや高め”，屋久島御崎、笠利崎、与路島で“平年並”，竹島で“かなり低め”，その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.7	+0.4	+0.4	やや高め
鹿児島	26.4	+0.9	-1.0	やや低め
佐多岬	26.0	+0.1	-1.0	やや低め
竹島	26.2	+0.4	-1.4	かなり低め
屋久島御崎	27.7	+0.4	-0.5	平年並
中之島	29.6	+1.4	+1.0	かなり高め
笠利崎	28.7	+0.5	+0.2	平年並
与路島	28.3	+0.8	+0.3	平年並
与論	28.0	+0.2	-0.6	やや低め
甕海峡	25.7	+0.5	-1.3	やや低め

鹿児島ー那覇定期客船観測は7/20-21
串木野ー甕定期客船観測は7/21

【漁況】

○定置網

甕島海域では、週計でヒラソウダ(1kg)が1.5トン、シイラ(2～3kg)が410kg、スマ(1～2kg)が220kgの入網。西薩南部海域では、シイラ(3～5kg)が50～100kg/日、イサキ(0.7～1.2kg)が40kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.5～1.7kg)が1～1.2トン/日、マサバ(200～300g)が600～700kg/日、カンパチ(1.7～2kg)が300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサバ(600～700g)が1.4トン、ハガツオ(1.2kg)が500kg、カンパチ(1.2kg)が250kg、イサキ(500g)が150kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がサバ類小、サバ類中、マシ豆主体に42トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、マシ、ヤマトカマス主体に9.9トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～9箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを1箱/統・日、青トビを1箱/統・日、セトビを9～20箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを1箱/統・日、青トビを1箱/統・日、セトビを12～18箱/統・日の漁。

○その他


甕島海域では、一本釣りでアオダイ(600g)を5kg/隻・日の漁。西薩海域では、かごでシロサハフグ(150～400g)を100～150kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.6～1kg)を9～20kg/隻・日、チダイ(300g)を1日のみ28kg/隻の漁。一本釣りでカンパチ(1～2kg)を2～16kg/隻・日、スジアラ(2～6kg)を2～14kg/隻・日、イサキ(400g)を8kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～300kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2kg)を27kg/隻・日、コマサバ(0.8～1kg)を12kg/隻・日の漁。潜水器漁業でトサカリを週計で4トンの漁。種子島海域では、一本釣りでアオダイ(0.7～1kg)を100kg/隻・日、ハマダイ(1～6kg)を100kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を150kg/隻・日、カンパチ(4～38kg)を20～200kg/隻・日、タマガシラ(300～400g)を60～70kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの5日操業でキハダ(40kg)を33尾/隻の漁。延縄の4日操業でムツ(1.5kg)を200kg/隻、キンメダイ(1～1.5kg)を70kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2815報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	0	—	7	195	
		中	22	132	串木野沖 長島 甕東	サバ類小15 サバ類中11 マルアジ小10	6.0	6	21	6	89
	枕崎	大	7	123	馬毛島	コマサバ中74 コマサバ中小26	17.6	2	16	4	137
		中	7	118	屋久島南 湯瀬 津倉 馬毛島	コマサバ中50 オアカムロ中小40	16.8	7	220	10	182
	内之浦	中	2	18	内之浦沖	サバ類小99	9.2	0	—	1	6
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	7	123			17.6	2	16	11	332	
	中	31	268			8.7	13	241	17	277	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	87	117	阿久根沖 長島	ウルメイワシ69 カクチイワシ22 サバ類仔5	1.3	22	27	83	131	
	内之浦	3	13	内之浦沖	サバ類小57 ウルメイワシ23 カクチイワシ20	4.4	2	8	1	2	
定置網	内之浦	30	42		サバ類小55 サバ類中16 マシ豆7	1.4	37	43	25	47	
刺網	阿久根	大	0	—	甕 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	35	6	79	14
		小	0	—			—	0	—	0	—
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	2	921	0	—
海外旋網	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	1	801		カツオ小80 キハダ17	801.2	0	—	1	738



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月21日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁7月21日発行「海洋速報令和2年134号」による。