

鹿児島県漁海況週報

令和3年2月4日発行(1月28日～2月3日)
第2889報(旧暦:12月16日～12月22日/月齢:14.9～20.9/潮汐:大潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月1日現在、屋久島御崎の北4.3マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月1日現在、27マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して鹿児島で0.3℃昇温し、その他の海域で0.2～2.0℃降温した。

平年比較では、中之島で“著しく低め”、黒潮流域で“かなり低め”、屋久島御崎で“やや低め”、鹿児島、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.2	-0.3	-0.8	かなり低め
鹿児島	16.9	+0.3	+0.5	やや高め
佐多岬	18.4	-0.6	+0.3	平年並
竹島	19.6	-0.7	-0.0	平年並
屋久島御崎	19.5	-1.7	-0.9	やや低め
中之島	19.2	-2.0	-2.4	著しく低め
笠利崎	20.9	-0.3	-0.2	平年並
与路島	21.2	-0.5	-0.0	平年並
与論	21.9	-0.2	+0.3	やや高め
壱岐海峡	-	-	-	-

鹿児島一那覇定期客船観測は2/1-2
串木野一鹿児島定期客船観測は船の定期検査のため欠測

【漁況】

○定置網

館島海域では、週計でメジナ(1kg)が420kg、キハダ(10kg)が120kg、ブリ(7～8kg)が120kgの入網。西薩南部海域では、タチウオ(0.2～1.5kg)が110kg/日、ゴマサハ(100g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(100～250g)が250～550kg/日、マサハ(150～200g)が150～300kg/日、ハカツオ(1.3～1.5kg)が150～200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.5～2kg)が520kg、ゴマサハ(300～500g)が520kg、クロダイ(1kg)が350kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がタチウオ、カクチイワシ、サハ類中主体に17トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、サワラ、アジ類主体に7.6トンの入網。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgを10尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、6～14kgを17～52尾/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを700～1000尾/統・日の漁。

○その他


館島海域では、曳縄でスマ(1kg)を100kg/隻・日、ハカツオ(2kg)を100kg/隻・日の漁。西薩海域では、底曳網でツキヒキ(100g)を60kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～1.5kg)を50kg/隻・日の漁。一本釣りでヘダイ(1～1.5kg)を30kg/隻・日、1日のみサワラ(1kg)を20kg/隻の漁。ごち網でマダイ(1kg)を7～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄で1日のみハカツオ(2kg)を70～350kg/隻、スマ(1kg)を20～100kg/隻の漁。刺網で1日のみマダイ(5～6kg)を300kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハカツオ(2kg)を50～75kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみカンゾウヒラメ(300～400g)を10kg/隻、ハモ(600～700g)を10kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を60～70尾/隻・日、1日のみマダイ(5kg)を90尾/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～4日操業でソデイカ(胴体のみ9kg)を16～25ハイ/隻、旗流しの7日操業でソデイカ(胴体のみ10kg)を190ハイ/隻の漁。一本釣りの2日操業でキハダ(11～35kg)を17尾/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ単釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2836報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	野間池沖 串木野沖	—	6	187	1	15	
		中	2	5	サハ類豆 マアジ22 サハ類小8	2.5	10	181	2	0.4	
	枕崎	大	1	20	志布志沖	ウルメイワシ64 ゴマサハ大18 マサハ大18	20.0	3	149	0	—
		中	3	43	馬毛島 野間池沖 島間沖	ゴマサハ大78 マサハ豆10 クサヤモロ中小9	14.3	16	369	3	34
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	1	20	—	—	20.0	9	336	1	15	
	中	5	48	—	—	9.6	26	550	5	34	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	0	—	—	—	—	20	12	0	—	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	30	17	—	タチウオ22 カクチイワシ20 サハ類中13	0.6	33	24	45	4	
刺網	阿久根	5	0.4	牛深沖 阿久根沖 館	キビナゴ100	0.1	29	2	29	3	
カツオ単釣	枕崎	大	1	357	—	カツオ大66 カツオ中33	—	1	41	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海外旋網	海旋	0	—	—	—	—	2	1550	0	—
		山川	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	2	1113	—	カツオ小91 キハダ5	556.5	2	1630	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月3日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁2月3日発行「海洋通報令和3年22号」による。