

鹿児島県漁海況週報

令和3年6月24日発行(6月17日～6月23日)
第2908報【旧暦:5月8日～5月14日/月齢:6.7～12.7/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、6月22日現在、屋久島御崎の南3マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月22日現在、27マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して屋久島御崎、笠利崎、与路島、与論で0.1～0.3℃降温し、その他の海域で0.1～4.0℃昇温した。平年比較では、笠利崎で“やや低め”、黒潮流域、屋久島御崎で“やや高め”、中之島で“かなり高め”、竹島、甌海峡で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.9	+0.4	+0.5	やや高め
鹿児島	23.6	+0.1	-0.3	平年並
佐多岬	24.1	+1.2	+0.2	平年並
竹島	27.1	+4.0	+2.5	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	26.2	-0.3	+0.8	やや高め
中之島	27.8	+0.3	+1.1	かなり高め
笠利崎	25.5	-0.2	-0.8	やや低め
与路島	25.7	-0.1	+0.2	平年並
与論	26.3	-0.3	-0.0	平年並
甌海峡	25.9	+1.8	+2.2	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/22-23
串木野一甌定期客船観測は6/23

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でメジナ(0.7～1kg)が175kg、カンパチ(1～2kg)が71kg、イサキ(300～500g)が20～30kg/日、ハマエビ(1.5～3kg)が1日のみ50kgの入網。西薩南部海域では、週計でトビウオ(60～130g)が150kg、ブリ(2～3kg)が100kg、マルアジ(300g)が100kg、イサキ(300～500g)が70kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.6kg)が254～721kg/日、ブリ(1.8～2kg)が270～523kg/日、イサキ(400～600g)が186～250kg/日、1日のみハマエビ(1.8～2kg)が180kg、キハダ(39～49kg)が3尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.6～1.7kg)が3.2ト、スマ(1.6kg)が400kg、ゴマサハ(500g)が280kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がサハ類中、マアジ豆、ウルメイワシ主体に37トの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、チウオ、サハ主体に18トの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～8箱/隻・日の漁。西薩南部海域では5～20箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを140～150箱/統・日の漁。屋久島海域では、セトビを70～88箱/統・日、中トビを10～21箱/統・日、青トビを6～12箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～2kg)を15～84kg/隻・日、チダイ(200～300g)を9～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～500g)を10～50kg/隻・日の漁。延縄でアカマダイ(300g)を8～23kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を10～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナカエビを100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、1日のみ底曳網でハモ(600～700g)を20kg/隻、オオコバ(1kg)を20kg/隻、キダイ(100～200g)を8kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(4～5kg)を30～40kg/隻・日、ゴマサハ(500～600g)を22～28kg/隻・日、1隻のみ2日操業でマダイ(1～4kg)を100kgの漁。奄美南部海域では、旗流しの1～4日操業でソテエ(胴体のみ11～13kg)を4～17ハイ/隻の漁。延縄で1隻のみ2日操業でキンメダイ(1kg)を224kg、ムツ(1kg)を22kgの漁。一本釣りで週計でマダイ(1.6kg)を23kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2859報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	66	天草沖 甌東	サハ類小34 サハ類豆22 マアジ仔17	11.0	0	—	1	5	
		中	138	甌西 長島	カクチイワシ35 ウルメイワシ35 サハ類豆15	11.5	14	120	9	36	
	枕崎	大	55	屋久島南	オアカムロ中73 ゴマサハ中13 ゴマサハ豆8	27.5	8	172	5	236	
		中	170	湯瀬 竹島 硫黄島沖	ゴマサハ中91	21.3	10	136	3	60	
	内之浦	中	—	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	—	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	8	121	—	—	15.1	8	172	6	241	
	中	20	308	—	—	15.4	24	256	12	96	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	56	100	阿久根沖 長島	ウルメイワシ61 カクチイワシ22 マイワシ小17	1.8	22	48	30	30	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	30	37	—	サハ類中33 マアジ豆14 ウルメイワシ13	1.2	27	23	41	34	
刺網	阿久根	90	12	甌 阿久根沖 川内沖 長島	キビナゴ100	0.1	111	17	34	7	
カツオ竿釣	枕崎	大	—	—	—	—	0	—	0	—	
		小	3	23	—	カツオ小100	—	1	11	0	—
	海旋	2	1256	—	カツオ中50 キハダ18 カツオ小18	628.0	1	732	0	—	
海外旋網	山川	中	6	47	—	カツオ小68 キハダ17 カツオ中13	7.8	4	42	0	—
		海旋	0	—	—	—	—	1	722	1	758



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月23日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月23日発行「海洋通報令和3年116号」による。