

# 鹿児島県漁海況週報


令和4年7月28日発行(7月21日～7月27日)  
第2963報【旧暦:6月23日～6月29日/月齢22.0～28.0/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

- 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は、7月25日現在、屋久島御崎の北8.6マイル付近にあり、接岸している。
- 黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は、7月26日現在、57マイル付近にある。
- 定期船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.3～1.6℃昇温した。  
平年比較では、甌海峡で“やや高め”，鹿児島、中之島、与論で“やや低め”，黒潮流域で“かなり低め”，その他の海域で“平年並”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.4	+0.5	-1.0	かなり低め
鹿児島	26.9	+0.3	-0.7	やや低め
佐多岬	27.3	+0.4	-0.1	平年並
竹島	27.6	+0.8	-0.3	平年並
屋久島御崎(永田岬)	28.3	+0.7	-0.2	平年並
中之島	28.3	+0.6	-0.5	やや低め
笠利崎	28.3	+0.9	-0.3	平年並
与路島	28.2	+1.6	-0.1	平年並
与論	28.0	+1.1	-0.7	やや低め
甌海峡	28.5	+1.1	+0.8	やや高め

鹿児島～那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/25～7/26  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野～甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は7/27

## 【漁況】

- 定置網**  
甌島海域では、ニサダイが100kg/日の入網。西薩南部海域では、ハガツオ(700～900g)が0.1～1t/日、シイラ(2kg)が100kg/日、カンパチ(300g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1～1.2kg)が0.3～2t/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(2.5～8kg)が1.8t、ハガツオ(700～800g)が480kg、ヒラマサ(800g)が70kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がブリ、ハガツオ、カマス類主体に51tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、マアジ、ニベ類主体に27tの入網。
- トビウオロープ曳網**  
種子島海域では、1日のみ小トビを20箱/統、中トビを4箱/統の漁。屋久島海域では、セトビを24～32箱/統・日、中トビを2～3箱/統・日、青トビを1～2箱/統・日の漁。
- キビナゴ刺網**  
西薩南部海域では、2～20箱/隻・日の漁。

## ○パッチ網

西薩海域では、製品で2.3tの入札があった。志布志湾海域では、製品で1.2tの入札があった。

## ○その他


西薩海域では、小型底曳網でツキヒガイ(100g)を120～130kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を8～50kg/隻・日の漁。一本釣りでスジアラ(3kg)を28～45kg/隻・日の漁。曳縄でハガツオ(1kg)を10～20kg/隻・日の漁。刺網でアカシビラメ(300g)を5～20kg/隻・日の漁。延縄でアカマダイ(300g)を9～15kg/隻・日、キダイ(300g)を7～10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～400kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを1.8t/日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(1kg)を150kg/隻・日、カンパチ(4～10kg)を50kg/隻・日、ハマダイ(2～5kg)を50kg/隻・日、ヒメダイ(0.5～1kg)を20～30kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でムツ(1～1.5kg)を120kg/隻の漁。一本釣りの日帰り操業でナンヨウキンメ(1.5kg)を20尾/隻、1～2日操業でキハダ(10～20kg)を5～10尾/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2914報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	10	甌東	マアジ小71 サハ類豆18 マアジ仔9	4.9	1	5	0	—
		中	18	116	長島 串木野沖	カタシイワシ50 マアジ小11 アカマス8	6.4	0	—	23	170
	枕崎	大	11	171	馬毛島	ゴマサハ中100	15.5	0	—	3	52
		中	12	154	馬毛島	ゴマサハ中94 クサヤモロ中小5	12.9	0	—	9	190
	内之浦	中	1	7	内之浦沖	ウルメイワシ100	6.6	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	13	181			13.9	1	5	3	52	
	中	31	277			8.9	0	0	32	360	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	68	171	阿久根沖 長島	ウルメイワシ86 カタシイワシ8	2.5	2	1	71	72	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	51		ブリ63 ハガツオ13 カマス類5	1.5	34	30	38	22	
刺網	阿久根	51	7	甌 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	1	0.4	14	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	854		キハダ42 カツオ中41 カツオ小10	853.7	1	1036	2	1561	
	山川	中	0	—		—	5	18	6	65	
	海旋	1	1005		カツオ小47 キハダ38 カツオ中13	1,004.7	1	865	1	744	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月27日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁7月27日発行「海洋速報令和4年138号」による。