

# 鹿児島県漁海況週報

令和5年8月31日発行(8月24日～8月30日)  
第3017報【旧暦：7月9日～7月15日/月齢7.7～13.7/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月30日現在、屋久島御崎の北6.7マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月29日現在、66マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、すべての海域で0.4～1.8℃昇温した。

平年比較では、甕海峡で“かなり高め”、竹島、屋久島御崎、与論で“やや高め”、笠利崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.3	+0.7	+0.0	平年並
鹿児島	28.5	+0.8	+0.5	平年並
佐多岬	28.4	+0.4	+0.3	平年並
竹島	29.0	+0.8	+0.7	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	29.3	+0.8	+0.7	やや高め
中之島	28.7	+0.7	-0.0	平年並
笠利崎	27.9	+0.4	-0.6	やや低め
与路島	28.0	+0.8	-0.4	平年並
与論	29.5	+1.8	+0.9	やや高め
甕海峡	29.4	+0.8	+1.3	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、8/30～8/31(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、8/30

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、シラ(2～3kg)が0.1～1t/日の入網。1日のみツムブリ(3kg)が300kg、ハンショウガキ(15～25kg)が2尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、キハダ(4～6kg)が300～400kg/日、シマジ(0.8～1kg)が50～200kg/日、ハガツオ(1kg)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でキハダ(3～9kg)が80kg、スマ(2～4kg)が60kg、シラ(3kg)が60kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で31統がウルメイワシ、キンカミ、チウオ主体に14tの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、テンジクチ、カクチワシ主体に4.4tの入網。

### ○バッチ網

志布志湾海域では、製品で6トンの入札があった。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを5～37箱/統・日、中トビを8～33箱/統・日の漁。1日のみ青トビを3箱/統の漁。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～3箱/隻・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(500～600g)を20～30kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を10kg/隻・日、イセビ(100～600g)を7～9kg/隻・日の漁。一本釣りでもモンハタ(0.5～1.5kg)を20尾/隻・日、カンパチ(2～3kg)を7尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～130kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、一本釣りでフダイ(1～2.5kg)を13尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセビ(200～300g)を週計で120kgの漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～6kg)を100kg/隻・日、カンパチ(1～12kg)を20～30kg/隻・日、アカマガシラ(300～500g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの4～5日操業でキハダ(20～50kg)を400～600kg/隻の漁。延縄の3日操業でキンメダイ(1～2kg)を350kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2965報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	120	甕東	マイワシ小64 ウルメイワシ25 カクチワシ11	29.9	13	456	2	17
		中	10	106	甕東 長島	マイワシ小70 ウルメイワシ12 カクチワシ6	10.6	17	319	12	99
	枕崎	大	4	277	甕東	マイワシ73 ウルメイワシ22 ゴマサハ豆5	69.2	9	319	3	125
		中	7	200	甕東	マイワシ61 ウルメイワシ24 ゴマサハ豆7	28.6	14	300	12	163
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	8	397			49.6	22	775	5	142	
	中	17	306			18.0	31	619	24	262	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	54	158	阿久根沖 長島	マイワシ小82 ウルメイワシ17	2.9	89	225	80	142	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	31	14		ウルメイワシ23 キンカミ13 チウオ10		34	21	30	16	
刺網	阿久根	26	2	甕 牛深沖 阿久根沖 川内沖	キビナゴ100	0.1	28	3	44	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	1	306		キハダ77 カツオ中18	306.3	1	576	0	—	
	山川	中	6	103		カツオ中46 カツオ小46 マチ5	17.2	2	25	0	—
	海旋	1	954		カツオ小38 カツオ中30 キハダ27	954.2	2	1251	1	309	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月30日付「海況日報」による。黒潮流域は、海上保安庁8月30日発行「海洋速報令和162号」による。