

鹿児島県漁海況週報

令和5年10月26日発行(10月19日～10月25日)
第3025報【旧暦：9月5日～9月11日/月齢4.4～10.4/潮汐：中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月25日現在、竹島の南7.3マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月24日現在、29マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島で0.5℃昇温し、中之島で変わらず、その他の海域で0.4～1.5℃降温した。

平年比較では、竹島で“かなり低め”、佐多岬で“やや低め”、屋久島御崎、笠利崎で“平年並”、鹿児島、甕海峡で“やや高め”、与路島、与論で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.8	-0.4	+1.4	著しく高め
鹿児島	24.0	-0.5	+0.5	やや高め
佐多岬	24.0	-0.7	-0.4	やや低め
竹島	24.5	-1.5	-0.9	かなり低め
屋久島御崎(永田岬)	25.7	-0.9	+0.0	平年並
中之島	27.3	+0.0	+1.1	著しく高め
笠利崎	26.3	-1.5	+0.4	平年並
与路島	27.3	+0.5	+1.0	かなり高め
与論	27.7	-0.5	+1.2	かなり高め
甕海峡	24.7	-1.3	+1.0	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、10/23～25(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は、10/25

【漁況】

○定置網

甕島海域では、シマシ(1kg)が1日のみ50kgの入網。西薩南部海域では、ウルメイワシ(50～120g)が200～300kg/日、マシ(50g)が200～300kg/日、スマ(400～500g)が50～200kg/日、カマスサワラ(5～10kg)が100kg/日、カンパチ(1kg)が20～60kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(3kg)が600～900kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(0.7～1kg)が90kg、シマシ(1kg)が80kg、ツムブリ(1～2kg)が60kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がカマス類、カンパチ、タチウオ主体に14tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマシ、キンガマシ、カンパチ主体に17.9tの入網。

○フリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(2.5～3.5kg)を6～90尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、フリ(4～4.5kg)を14～69尾/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ中トビを60箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを28～133箱/統の漁。

○ハシウカジキ情報

甕島海域では、流し網で20kgを週計で23尾の漁。西薩南部海域では、定置網で20～30kgが1～6尾/日の入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～5箱/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、一本釣りでカンパチ(1kg)を10～30kg/隻・日の漁。ごち網でマシ(1kg)を8～16kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでカマスサワラ(8～18kg)を週計で40尾の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(4～20kg)を10尾/隻・日、アダイ(0.5～1kg)を70～80kg/隻・日、ウメロ(0.5～1kg)を70～80kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3～5日操業で、キハタ(24～48kg)を650kg/隻、タチウオ(1.5～2.3kg)を80kg/隻の漁。延縄の5日操業で、キンマシ(1～2kg)を264kg/隻、ムツ(1～2kg)を80kg/隻、マシ(5～8kg)を63kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2973報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	224	天草沖	ウルメイワシ66 マイワシ小19 カタチイワシ12	44.8	11	310	7	214
		中	17	277	縄瀬	ウルメイワシ47 マシ仔22 マイワシ小15	16.3	11	222	7	83
	枕崎	大	1	73	甕東	マイワシ58 ウルメイワシ42	72.7	3	143	14	421
		中	9	160	甕東	マサハ豆28 マシ豆25 マイワシ19	17.8	9	343	14	191
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	6	297			49.5	14	453	21	635	
	中	26	436			16.8	20	565	21	274	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	512		ゴマサハ中58 ゴマサハ豆40	170.6	3	285	0	—	
棒受網	阿久根	39	56	阿久根沖 長島	ウルメイワシ84 マイワシ小9	1.4	35	81	53	151	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	32	14		カマス類26 カンパチ13 タチウオ10	0.4	29	17	34	22	
刺網	阿久根	33	2	甕 川内沖 長島 牛深沖	キビナゴ100	0.1	27	2	9	0.4	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	
	山川	中	3	17		キハタ59 カツオ小39	5.6	6	53	4	46
		海旋	1	416		カツオ中34 キハタ34 カツオ小28	416.0	3	2178	2	1394



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月25日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月25日発行「海洋速報令和200号」による。