

鹿児島県漁海況週報

令和5年11月16日発行(11月9日～11月15日)
第3028報【旧暦：9月26日～10月3日/月齢25.4～1.7/潮汐：若潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月12日現在、屋久島御崎の南1.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月14日現在、33マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、屋久島御崎で0.1～0.7℃昇温し、その他の海域で0.3～1.3℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“平年並”、黒潮流域で“かなり高め”、屋久島御崎、中之島で“著しく高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|------------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 26.3 | -0.9 | +0.8 | かなり高め |
| 鹿児島 | 22.6 | -0.8 | +0.6 | やや高め |
| 佐多岬 | 23.6 | +0.5 | +0.6 | やや高め |
| 竹島 | 25.0 | +0.7 | +0.7 | やや高め |
| 屋久島御崎(永田岬) | 26.0 | +0.1 | +1.4 | 著しく高め |
| 中之島 | 26.3 | -0.7 | +1.1 | 著しく高め |
| 笠利崎 | 25.2 | -1.2 | +0.5 | やや高め |
| 与路島 | 26.0 | -0.3 | +0.9 | やや高め |
| 与論 | 26.0 | -0.5 | +0.8 | やや高め |
| 甌海峡 | 22.2 | -1.3 | +0.5 | 平年並 |

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、11/12～11/15
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、11/15

【漁況】

○定置網

甌島海域では、イシガキダイ(1～1.5kg)が100kg/日、シマアジ(1～1.5kg)が90kg/日、ウツボ(200～300g)が50kg/日の入網。週計でハガツオ(1.5～2kg)が110kg、ウマヅラハキ(700～800g)が60kg、スマ(2.5kg)が30kg、カツオ(3kg)が30kg、ハシロウナギ(30～40kg)が10尾の入網。西薩南部海域では、ツバメコシロ(100～200g)が500kg/日、カンパチ(0.6～1kg)が100～300kg/日、ウルメイワシ(100g)が100kg/日、マアジ(20～30g)が100kg/日、ブリモドキ(2kg)が50kg/日、カマスワラ(8～10kg)が50kg/日、ブリ(5kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(1kg)が300～800kg/日の入網。1日のみキハタ(6～7kg)が500kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1kg)が390kg、カマスワラ(7～14kg)が60kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で39統がウルメイワシ、カンパチ、カマス類主体に16tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、アカマス、クロダイ主体に17.3tの入網。

○ブリ銅付け


鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(3～5kg)を80尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(3～5.6kg)を6～60尾/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2976)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | | |
|------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 9 | 138 | 縄瀬 牛深沖 | ウルメイワシ40 サハ類豆25 カクチイワシ19 | 15.3 | 9 | 203 | 7 | 298 |
| | | 中 | 7 | 137 | 阿久根沖 縄瀬 | ウルメイワシ58 カクチイワシ14 マイワシ小14 | 19.6 | 12 | 227 | 7 | 40 |
| | 枕崎 | 大 | 0 | — | | | — | 0 | — | 4 | 57 |
| | | 中 | 9 | 234 | 宇治 竹島 甌東 | クサヤモロ豆44 クサヤモロ小19 マイワシ9 | 26.0 | 5 | 79 | 11 | 288 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 計 | 大 | 9 | 138 | | | 15.3 | 9 | 203 | 11 | 355 |
| 中 | 16 | 371 | | | | 23.2 | 17 | 306 | 18 | 328 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 1 | 185 | 西沖 | マサハ豆91 マアジ中小6 | 185.0 | 0 | — | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 27 | 30 | 阿久根沖 長島 | ウルメイワシ63 キビナゴ25 | 1.1 | 15 | 26 | 38 | 59 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 39 | 16 | | ウルメイワシ28 カンパチ16 カマス類16 | 0.4 | 39 | 18 | 36 | 25 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 21 | 3 | 甌 長島 牛深沖 川内沖 | キビナゴ100 | 0.1 | 2 | 0.1 | 8 | 0.8 |
| | | 小 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 海旋 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 山旋 | 0 | — | | | — | 3 | 1332 | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 1 | 8 | 4 | 29 |
| | | 海旋 | 1 | 327 | | カツオ小78 キハタ15 カツオ中5 | 327.0 | 1 | 519 | 1 | 828 |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月15日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月15日発行「海洋速報令和214号」による。