

# 鹿児島県漁海況週報

令和6年2月8日発行(2月1日～2月7日)  
第3039報【旧暦：12月22日～12月28日/月齢20.6～26.6/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月5日現在、平瀬の北10.8マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月6日現在、69マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、竹島、屋久島御崎、与論で0.2～1.3℃昇温し、その他の海域で0.1～1.2℃降温した。

平年比較では、佐多岬、竹島、与路島で“平年並”、笠利崎で“やや高め”、鹿児島、甑海峡で“著しく高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.8	-0.1	+0.9	かなり高め
鹿児島	17.6	+1.0	+1.3	著しく高め
佐多岬	18.1	+1.3	+0.2	平年並
竹島	19.8	+0.6	+0.3	平年並
屋久島御崎(永田岬)	21.7	+0.2	+1.5	かなり高め
中之島	22.4	-0.4	+0.9	かなり高め
笠利崎	21.8	-0.5	+0.7	やや高め
与路島	21.3	-0.2	+0.2	平年並
与論	22.5	+0.8	+1.1	かなり高め
甑海峡	19.3	-1.2	+3.0	著しく高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、2/5～6  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甑定期客船(フェリーニューこしき)観測は、2/7

## 【漁況】

### ○定置網

甑島海域では、週計でフリ(10kg)が10尾、マダイ(2～2.5kg)が50kg、ヒラマサ(600g)が40kgの入網。西薩南部海域では、ゴマサバ(200～300g)が0.2～1t/日、フリ(5kg)が200kg/日、イサキ(400g)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、シマジ(1kg)が170kg/日、1日のみマシ(60～70g)が1tの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がサバ類中、カマス類、フリ主体に8tの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカマス、カンパチ、マルソウダ主体に7tの入網。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～6kgを20尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、4～5kgを20～80尾/隻・日の漁。

### ○キビナゴ刺し網

甑島海域では、3～8箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを1～4箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、小型底曳網でツキガイ(70～100g)を50～100kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を30～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄でスマ(1.5kg)を20～30kg/隻・日の漁。1日のみ刺網でマダイ(5kg)を150kg/隻の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(200g)を週計で40kgの漁。屋久島海域では、1日のみ一本釣りでマダイ(3～6kg)を150尾/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの4～8日操業でソデイ(胴体のみ8～12kg)を1.2t/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2987報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	270	縄瀬 五島	サバ類小29 サバ類豆22 マシ仔19	33.8	5	186	1	5
		中	8	152	縄瀬	マシ仔35 サバ類小29 ウルメイワシ18	19.0	4	65	4	54
	枕崎	大	7	297	串木野沖 甑東	ゴマサバ豆28 ゴマサバ大19 マシ豆16	42.4	2	36	1	8
		中	12	311	串木野沖	ゴマサバ大32 ゴマサバ中小26 ウルメイワシ12	25.9	4	49	8	84
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	15	567			37.8	7	222	2	13	
	中	20	463			23.2	8	114	12	138	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	4	218	黄海	クサヤモロ中小40 クサヤモロ豆33 クサヤモロ小27	54.5	1	115	0	—	
棒受網	阿久根	20	12	阿久根沖 長島	カクチイワシ44 キビナゴ43 ウルメイワシ9	0.6	0	—	2	1	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	8		サバ類中24 カマス類13 フリ12	0.2	36	11	36	8	
刺網	阿久根	47	7	牛深沖 甑 阿久根沖 川内沖	キビナゴ100	0.1	37	4	20	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	145		カツオ中69 カツオ大28	—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	0	—	1	1020	
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	148		カツオ小51 キハダ24 カツオ中17	148.0	2	566	1	809	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月7日付「海況日報」による。  
黒潮流域は、海上保安庁2月7日発行「海洋速報令和6年24号」による。