

鹿児島県漁海況週報

平成30年8月9日発行(8月2日～8月8日)
第2767報【旧暦:6月21日～6月27日/月齢20.0～26.0/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、8月8日現在、屋久島御崎の南5.9マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月7日現在、45マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、すべての海域で0.2～1.5℃昇温した。
平年比較では中之島、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



【漁況】

○定置網

甌島海域では、マシナ(0.5～1.4kg)が10～100kg/日、シマシ(0.6～1.5kg)が20～30kg/日の入網。西薩南部海域では、シラ(0.7～1.5kg)が1.5～2トン/日、マルソウダ(500g)が10～200kg/日、イサキ(300g)が10～20kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.1～2kg)が150～190kg/日、ゴマサハ(500～700g)が250～550kg/日、マシナが250～550kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ヒラソウダ(0.5～1kg)が30～150kg/日、カンパチ(1～2kg)が15～100尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がマシナ豆、サハ類小、ウルメイワシ主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、カクチワシ、ニハ類主体に6.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～6箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セミビを2～5箱/統・日、1日のみ中トビを1箱/統の漁。

○その他

甌島海域では、一本釣りでマダイ(0.5～1.5kg)を5～6尾/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(300～900g)を5～30kg/隻・日、チダイ(200～300g)を7～50kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(500～600g)を5～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を12～20kg/隻・日の漁。かごでシロサハフグ(200～300g)を150～200kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを200～400kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(200～600g)を5～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りハカツオ(1～3kg)を50～60kg/隻・日、ゴマサハ(0.7～1.2kg)を25～30kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、一本釣りマシナ(500～600g)を5～10kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りマシナ(0.7～2.5kg)を5～10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣り1日のみアオダイ(700～800g)を150kg/隻、ハマダイ(2～3kg)を40～50kg/隻、カンパチ(5～20kg)を7～8尾/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でキタ(15～20kg)を10～30尾/隻の漁。一本釣りの2～3日操業でチウオ(1～1.2kg)を80～90kg/隻の漁。延縄の3日操業でマダイ(5～6kg)を200kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


※前年同期(第2717報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	196	枕崎沖 天草沖	サハ類小59 サハ類大35	32.7	2	14	0	—
		中	28	357	長島 串木野沖 枕崎沖 縄瀬	コシロ48 サハ類豆12 カクチワシ11	12.8	0	—	8	87
	枕崎	大	10	477	津倉 馬毛島	ゴマサハ中49 ゴマサハ豆46	47.7	0	—	0	—
		中	20	427	馬毛島 津倉 野間池沖 草垣	ゴマサハ中47 ゴマサハ豆42	21.3	0	—	0	—
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	16	673			42.1	2	14	0	0	
	中	48	784			16.3	0	0	8	87	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	110	234	阿久根沖 長島	ウルメイワシ88 カクチワシ8	2.1	18	23	12	10	
	内之浦	3	4		ウルメイワシ94 ソウダガツオ類6	1.2	0	—	0	—	
定置網	内之浦	30	14		マシナ豆43 サハ類小11 ウルメイワシ11	0.5	28	28	24	19	
刺網	阿久根	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	枕崎	海旋	1	734		カツオ中59 キハダ28 カツオ大6	734.3	2	2242	0	—
		中	1	8		カツオ小71 キハダ27	7.6	3	35	0	—
	山川	海旋	2	1741		カツオ小72 キハダ18 カツオ中6	870.6	0	—	0	—

表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.7	+0.9	+0.2	平年並
鹿児島	28.5	+1.5	+0.3	平年並
佐多岬	28.6	+0.9	+0.5	平年並
竹島	28.7	+0.8	+0.3	平年並
屋久島御崎	28.8	+1.0	+0.1	平年並
中之島	29.5	+1.0	+0.7	やや高め
笠利崎	28.9	+1.0	+0.2	平年並
与路島	28.4	+0.7	-0.2	平年並
与論	28.6	+0.2	-0.2	平年並
甌海峡	29.6	+0.8	+1.3	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は8/8-9
串木野一甌定期客船観測は8/8



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月8日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月8日発行「海洋速報平成30年148号」による。