鹿 児 島 県 漁 海 況 週 報

令和2年9月24日発行(9月17日～9月23日)
第2871報【旧暦:8月1日～8月7日/月齢:29.0～5.7/潮汐:大潮～小潮】

鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海　況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は，9月21日現在，屋久島御崎の北10.6ﾏｲﾙ付近にあり，接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は，9月22日現在，90ﾏｲﾙ付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は，先週と比較して，黒潮流域，屋久島御崎，与論で0.1～0.7℃昇温し，竹島，中之島で変わらず，その他の海域で0.2～1.3℃降温した。

平年比較では，黒潮流域，中之島，与論で“やや高め”，鹿児島，佐多岬，竹島で“やや低め”，その他の海域で“平年並み”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評 価
黒潮流域	28.8	+0.1	+0.5	やや高め
鹿児島	25.5	−1.3	−1.0	やや低め
佐多岬	26.2	−0.6	−0.8	やや低め
竹 島	27.1	+0.0	−0.4	やや低め
屋久島御崎	28.0	+0.7	+0.3	平年並
中之島	28.6	+0.0	+0.7	やや高め
笠利崎	27.4	−0.9	−0.3	平年並
与路島	27.9	−0.7	−0.0	平年並
与論	28.6	+0.1	+0.6	やや高め
甑海峡	26.7	−0.2	+0.2	平年並

鹿児島ー那覇定期客船観測は9/21-22
串木野ー甑定期客船観測は9/22

【漁　況】

○定置網

西薩南部海域では，ｺﾞﾏｻﾊﾞ(250g)が700～800kg/日，ﾌﾞﾘ(700～800g)が100kg/日，ﾍﾀﾞｲ(500g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では，ﾊｶﾞﾂｵ(1.1～1.2kg)が0.2～1.1ﾄﾝ/日，ｶﾝﾊﾟﾁ(0.5～3kg)が250～300kg/日，ｶﾏｽｻﾜﾗ(5～8kg)が16尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では，週計でｽﾏ(1.5～1.6kg)が780kg，ﾄﾋﾞｳｵ(200～300g)が160kg，ﾀﾁｳｵ(1～2kg)が60kgの入網。大隅半島東部海域では，週計で35統がﾊﾏﾌｴﾌｷ，ｶﾏｽ類，ﾍﾀﾞｲ主体に17ﾄﾝの入網。志布志湾南部海域では，週計でﾀﾁｳｵ，ﾍﾀﾞｲ，ﾆﾍﾞ類主体に5ﾄﾝの入網。

○バショウカジキ情報

定置網では，西薩南部海域で20～30kgが1～2尾/日，鹿児島湾口部薩摩半島側で26～46kgが1～7尾/日の入網。流し網では，甑島海域で25～40kgが50～60尾/日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では，2.5～6kgを1～300尾/隻･日の漁。

○キビナゴ刺網

甑島海域では，2～3箱/隻･日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では，1日のみ中ﾄﾋﾞを150箱/統，小ﾄﾋﾞを10箱/統の漁。

屋久島海域では，中ﾄﾋﾞを50～51箱/統･日，ｱｵﾄﾋﾞを1日のみ2箱/統，ｾﾐﾄﾋﾞを1日のみ3箱/統の漁。

○その他

西薩海域では，底曳網でﾂｷﾋｶﾞｲ(100g)を100kg/隻･日の漁。一本釣りでｶﾝﾊﾟﾁ(0.6～2kg)を10～30kg/隻･日の漁。西薩南部海域では，底曳網でﾋｹﾞﾅｶﾞｴﾋﾞを10～250kg/隻･日の漁。一本釣りでｲｻｷ(300～400g)を10～20kg/隻･日，ｱｶﾊﾀ(200～450g)を10～20kg/隻･日の漁。大隅半島南部海域では，たもすくいでﾄﾋﾞｳｵ(200g)を5～16箱/隻･日の漁。志布志湾海域では，底曳網でﾏﾀﾞｲ(1～2.5kg)を40kg/隻･日，ｲﾎﾞﾀﾞｲ(100～200g)を20kg/隻･日，ﾎｼｻﾞﾒ(3～4kg)を20kg/隻･日の漁。屋久島海域では，一本釣りでﾒﾀﾞｲ(5kg)を120kg/隻･日，ﾀﾏｶﾞｼﾗ(400～500g)を60kg/隻･日，ﾊﾏﾀﾞｲ(2～3kg)を30～40kg/隻･日の漁。奄美南部海域では，一本釣りの3日操業でｷﾊﾀﾞ(20～40kg)を10～25尾/隻，ﾋﾞﾝﾅｶﾞ(10～20kg)を4～12尾/隻の漁。一本釣りでﾊﾏﾀﾞｲ(1.5～3kg)を10～20kg/隻･日の漁。

(旋網，棒受網，カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別･漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2819報)

漁業種類	漁 港		隻数	漁獲量(ﾄﾝ)	漁 場	魚種組成(%)	1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量
旋 網	阿久根	大	0	—			—	7	252	3	120
		中	7	82	縄瀬	ﾏｱｼﾞ仔34 ｻﾊﾞ類豆25 ｻﾊﾞ類小19	11.8	34	480	7	50
	枕 崎	大	8	581	黒島 鷹島 硫黄島沖 甑下	ﾏｲﾜｼ45 ｶﾀｸﾁｲﾜｼ26 ｳﾙﾒｲﾜｼ14	72.7	8	365	3	73
		中	10	199	硫黄島沖 鷹島 黒島	ﾏｲﾜｼ33 ｶﾀｸﾁｲﾜｼ29 ｳﾙﾒｲﾜｼ10	19.9	18	414	6	82
	内之浦	中	1	1	内之浦沖	ｻﾊﾞ類中100	1.3	0	—	0	—
	山 川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	8	581			72.7	15	617	6	193
		中	18	283			15.7	52	894	13	132
東海旋網	阿久根		0	—			—	0	—	0	—
	枕崎		0	—			—	0	—	0	—
棒受網	阿久根		36	51	阿久根沖 長島	ｳﾙﾒｲﾜｼ92 ｻﾊﾞ類仔7	1.4	71	114	15	13
	内之浦		0	—			—	0	—	0	—
定置網	内之浦		35	17		ﾊﾏﾌｴﾌｷ20 ｶﾏｽ類20 ﾍﾀﾞｲ13	0.5	34	26	34	11
刺 網	阿久根		19	1	甑 長島 阿久根沖 川内沖	ｷﾋﾞﾅｺﾞ100	0.0	32	3	37	4
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	1	713		ｶﾂｵ小48 ｷﾊﾀﾞ20 ｶﾂｵ中20	712.8	3	2915	0	—
	山川	中	9	84		ｶﾂｵ小59 ｷﾊﾀﾞ35 ｼｲﾗ5	9.3	3	24	0	—
		海旋	1	806		ｶﾂｵ小73 ｷﾊﾀﾞ15 ﾒﾊﾞﾁ7	806.0	2	1808	1	728



表面水温分布図は，(社)漁業情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ提供の9月23日付「海況日報」による。
黒潮流軸は，海上保安庁9月23日発行「海洋速報令和2年175号」による。